

8.1.2015

Valmistelu:

- kananmuna keitetään kypsäksi, kiehumisaika 10 minuuttia
- kuorittu kananmuna halkaistaan ja keltuainen poistetaan
- valkuainen hienonnetaan terävällä veitsellä mahdollisimman pieneksi silpuksi
- annokset mitataan joko punnitsemalla vaakaa käyttäen tai 1 ml:n ja 5 ml:n mittalusikoilla.

Tiedoksi:

- altistuksen yhteenlaskettu kananmunan valkuaisen määrä 12,25 g vastaten 1/3 kananmunan valkuaisesta.

Avoin altistus keitetty kananmunan valkuainen Proteiinipitoisuus 9,8 g / 100 g	Nimi	Lähetävä lääkäri
	Henkilötunnus	Valvova lääkäri
Aloituspvm		Hoitaja
Kananmunan aiheuttamaksi epäilty oire:		
Lähtötilanne ennen altistusta :		
Pituus (cm):	Paino (kg):	


Altistuksessa kananmunaa annetaan 30 minuutin välein oireita seuraten. Viimeisen annoksen jälkeen lapsen vointia seurataan 2 tuntia.

		Määrä	350 mg = 0,5 ml	1,4 g = 2 ml	3,5 g = 5 ml	7 g = 10 ml	
		Klo					
I. IHO	A. Ihottuma	% ihosta					
	B. Kutina	1 = Ajoittaista raapimista					
		2 = Raapimista > 2min kerrallaan					
		3 = Kovaa jatkuvaa raapimista					
	C. Urtikaria	1 = < 3 paukamaa, lievä huulen turvotus					
		2 = 3-10 paukamaa, merkittävä huulen tai kasvojen turvotus					
		3 = Yleistynyt urtikaria					
	D. Ihottuma	1 = Muutamia vaaleita alueita					
		2 = Ihottuma-alueita					
		3 = Ihottumaa > 50 % ihosta					
II. YLEMMÄT HENGITYSTIET	A. Nuha	1 = Satunnaista niiskutusta ja aivastuksia					
		2 = Tiheä niiskutus, < 10 aivastusta, nenän tai silmien hankaus ajoittain					
		3 = Jatkuva aivastelu, nenän tai silmien hankaus, turvotus ja vuoto					
III. ALEMMAT HENGITYSTIET	A. Astma	1 = Uloshengitysvinkunoita auskultaatiossa					
		2 = Ulos- ja sisäänhengitysvinkunoita auskultaatiossa					
		3 = Kuuluvat vinkunat, apuhengitysilhakset käytössä					
	B. Larynks	1 = > 3 kurkun selvittelyä tai yskimistä, jatkuva kurkun turvotus tai kipu					
		2 = Käheys, kuivaa yskää					
		3 = Stridor					
IV. SUOLISTO	A. Subjekttiivinen	1 = Pahoinvointi, mahakipu, suun tai nielun kutina					
		2 = Jatkuva pahoinvointi tai mahakipu, yleistila hyvä					
		3 = Tuskaiset suolioireet, väsähtäneisyys					
	B. Objekttiivinen	1 = 1 oksennus tai ripuli					
		2 = 2-3 oksennusta tai ripulia tai 1 kumpaakin					
		3 = > 3 oksennusta tai ripulia tai 2 kumpaakin					
V. KARDIOVASKULAARINEN JA NEUROLOGINEN		1 = Heikotus, huimaus, takykardia					
		2 = > 20 % lasku verenpaineessa, sekavuus					
		3 = Kardiovaskulaarinen kollapsi, tajuttomuus					
		YHTEENSÄ	0	0	0	0	0


	Vihreä ruutu: altistusta jatketaan
	Oranssi ruutu: voidaan edetä, pidentää annosväliä tai toistaa sama annos; 3 oranssia ruutua merkinä todellisesta reaktiosta ja altistus voidaan lopettaa
	Punainen ruutu: objektiiviset oireet merkinä todellisesta reaktiosta ja altistus lopetetaan (1 punainen ruutu riittää)

8.1.2015

Ennen altistusta



Altistuksen jälkeen



Pinta-alat
etu + taka (alle 2v)
Pää 4,5 + 4,5 % (8,5 + 8,5 %)
Kädet 4,5 + 4,5 % (4,5 + 4,5 %)
Vartalo 18 + 18 %
Jalat 9 + 9 % + 9 + 9 % (9 + 6 % + 9 + 6 %)
Genitaalit 1 %